




INFEKCIŅĒS LIGOS YRA RIMTAS VERSLAS ...

Kokia tikimybė užsikrėsti infekcine liga?

ISTABUS . Visi viešieji paviršiai gali būti užteršti bakterijos ar virusai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) stafilokoką, hepatitas, norovirusas (COVID-19, SARS), streptokokas, ŽIV, salmonelės, H1N1 (kiaulių gripas), rinovirusai, C. Difficile ir kt. Nėra paviršiaus saugu, o kai kurie yra blogesni už kitus.

- Buvo nustatyta, kad rašomuosiuose staluose yra 400 kartų daugiau bakterijų nei tualetų kėdėje.
- Testai parodė, kad vos per kelias valandas virusai gali išplisti 60% pastato gyventojų iš vienos durų rankenos.
- Tyrimai nustatė, kad 28% sporto salės paviršiaus buvo teigiami užteršimas
- CDC statistika parodė, kad 3 iš 4 noroviruso protrūkių įvyko 2005 m ilgalaikės priežiūros įstaigos ir slaugos namai



Kas rizikuoja? Visi.



Mums visiems gresia pavojus - nuo savo vaikų iki naminių gyvūnėlių ir pagyvenusių žmonių. ♦ dienos darželiai ir mokyklos ♦ sporto įrenginiai ir sporto salės ♦ biurai ir parduotuvės ♦ maisto perdirbimo ♦ restoranai ir Maisto prekių rinkose ♦ traukiniai, lėktuvai ir autobusai ♦ viešbučiai ir kruizinių laivų ♦ Pristatymas ir valtytės ♦ teatrai, kino ir pramogų parkai ♦ ligoninės, medicinos įstaigos ir pirmieji respondantai ♦ žemės ūkis ♦ veterinarija Yra žinoma, kad net gyvenamieji namai yra plintantys ligos, taip pat pelėsių ir alergenų poveikis.

alergenų.

Žinoma, kad net namuose plinta infekcinės ligos, jie yra veikiami pelėsių ir

Kas blogai naudojant Bleach and Quats to dezinfekuoti ir dezinfekuoti?

- Tradiciniai dezinfekavimo / dezinfekavimo metodai, tokie kaip chloro baliklis ir ketvirtinis amonis junginiai arba kvatai yra toksiški žmonėms, esdintys medžiagas ir kenkiantys aplinkai jie išleidžiami į. Klortab NaDCC tabletės, kurios gamina hipochloro rūgštį (HOCL) į vandenį dedamos yra mažiau toksiškos chloro baliklių ir kvatų alternatyvos.

Kadangi chloro baliklis yra a hipochloritas (-OCL) ir yra labai didelis reaktyvus, nešvarus, nestabilus ir jautrus šviesai ir temperatūrai. Kvatai ir chloras baliklis gali sustiprinti arba sukelti astmą.	Chloro baliklio koncentratas pradeda degraduoti nuo jo pagaminimo momento ir per mėnesį lengvai praranda trečdalį ar daugiau savo veiklos. Kai praskiestas baliklis veiksmingas tik kelias valandas.	Be to, baliklis ir quats yra labai koroziniai metalams ir kiti paviršiai toksiškas aplinkai ir nesaugu žmonėms elgtis arba įkvėpkite jo garų.
---	--	---

ADA AQUA KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Çamlıca Mahallesi 147. Cadde Dimas İşyerleri Sitesi No:4-C Yenimahalle Ankara

PHONE: 0312 387 00 47 FAX: 0312 387 00 43 GSM: 0554 870 50 01

E.MAIL: info@adaaqua.com.tr www.adaaqua.com.tr

ALIERINIAI FAKTAI

Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) duomenimis;

- Daugiau nei du milijonai amerikiečių susiduria su liga, dėl kurios kiekvienais metais dėl antibiotikams atsparių infekcijų išsivysto 23 000 mirčių.
- Kiekvienais metais 20% JAV gyventojų serga gripu, o dešimtys tūkstančių yra hospitalizuojami.
- Norovirusas yra svarbiausia ūminio gastroenterito protrūkio priežastis visame pasaulyje.
- Norovirusas kasmet paveikia apie 21 milijoną amerikiečių
- Sukelia daugiau nei 2 mln ambulatorinės / ER vizitus ar hospitalizacijų ir sukelia 800 mirčių
- Paliesdami užterštą paviršių, tada paliesdami savo burnoje, plinta 61% viduriavimo ar vėmimo protrūkių.
- Nėra vakcinos, kuri užkirstų kelią norovirusinei infekcijai.
- 2015 m. Kovo mėn. Pusė numatytų 25 000 asmenų užsikrėtęs Ebolos virusu galiausiai mirė.
- Peršalimas, rinovirusas, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma mūsų gyventojų praleidžia mokyklą ar dirbti kiekvienais metais.



ATĖJO LAIKAS INICIATYVUS SPRENDIMAS INFЕКCINĖ LIGA PREVENTION- VIENAS, KAD YRA GREITAS, SAUGUS IR EFEKTYVAUS.

Kasmet kovai su infekcinėmis ligomis skiriama milijardai. Anksčiau buvo sunku įgyvendinti proaktyvius metodus, tačiau taip nebėra.

Proaktyvus HAZERHAN sprendimas - KLORTAB NaDCC



Klortab NaDCC yra tvari, kieta natrio triklozeno (NaDCC) tablečių forma, kuri lengvai ištirpsta vandenyje, kad taptų galinga hipochlorito rūgštimi (HOCL), kuri, atsižvelgiant į tai, yra pakankamai universali koncentracijos, naudoti kaip maisto paviršiaus dezinfekavimo priemonę ir ligoninės dezinfekavimo priemonę. Jei nežinai iš daugelio HOCL privalumų atėjo laikas. Šis daigafunkcinis EPA užregistruotas dezinfekavimo / dezinfekavimo priemonė, kartu su žaliomis valymo priemonėmis ir tinkama paskirtimi technologija pažodžiui SPRENDŽIA kasdienio valymo ir dezinfekavimo laiko apribojimus ir proceso problemas / dezinfekcija. „Klortab NaDCC“ keičia sargų / laisvės atėmimo vietų pramonę į gerąją pusę.

MOKSLAS UŽ KLORTABO NaDCC

KODĖL HOCI 100 KARTŲ Stipriau?

Klortab NaDCC veiklioji medžiaga yra natrio troklozenas (NaDCC). Nors jame yra chloro hipochlorito rūgšties (HOCL) forma sanitarijos ir dezinfekcijos tikslais, tai nėra hipochloritas, chloro baliklis. NaDCC chemija ir veikimo būdas gerokai skiriasi, todėl susidaro a tirpalas, kuris praskiedus yra stabilus, ypač esant organiniams teršalams.

- HOCL cheminė struktūra yra lygi vandeniui (H_2O).
- Jis yra vienodo formato ir neaktyvus elektrai.
- Šie parametrai leidžia jam pereiti į ląstelės sienelę lygiai taip pat, kaip ir vandeniui
- OCI^- yra elektra įkrautas, todėl sunku prasiskverbti į ląstelės sienelę.
- Neaiškus mechanizmas
- Sunaikinkite baltymų ir fermentų sistemas.
- Išskleiskite ląstelės sienelę.

ADA AQUA KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Çamlıca Mahallesi 147. Cadde Dimas İşyerleri Sitesi No:4-C Yenimahalle Ankara

PHONE: 0312 387 00 47 FAX: 0312 387 00 43 GSM: 0554 870 50 01

E.MAIL: info@adaaqua.com.tr www.adaaqua.com.tr

KOKIOS INFECTINĖS LIGOS Kainuoja?

- **JAV** : iki 2 mln. Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų per metus, iš kurių 80 000 yra mirtinos ar gali prisidėti prie mirties.
- **EUROPA** : 5 milijonai su ligoninėmis susijusių infekcijų per metus, iš kurių 50 000 (1%) yra mirtinos arba prisideda prie mirties 135 000 atvejų (2,7%).
- **Japonija** : MRSA atsparumo izoliacija (atsparus meticilinui staphylococcus aureus): 40–80%
- **INDIJA** : apytiksliai nuo 10 iki 30% pacientų, paguldytų į ligo nines ir slaugos namai įgyja hospitalinę infekciją.

3 TABLEČIŲ DYDŽIAI UŽMUŠA DAUGYBĘ MIKROBŲ

Klortab NaDCC įvairios paskirties tabletės turi daug įvairių naudojimo ir yra prieinamas 3 planšetinių dydžių lengvai maišymo ir skiedžiant.

Klortab NaDCC skirta pačios pavojingiausios mikrobai, kurie turi įtakos kiekvienam sektoriui, nuo ne-nuvalykite sanitarijos restoranų iki didelio galingumo ligoninės lygio dezinfekcijai, ir viskas tarp.



NAUDOJAMOSIOS SRITYS	KONCENTRACIJA	SKIEDIMAS
Maisto kontaktinis paviršius dezinfekuojančios (Nėra Skalavimo)	100 ppm	3,4gr - 1 tabletė - 10 litrų 5gr - 1 tabletė - 15 litrų 17,4gr - 1 tabletė - 50 litrų
Ligoninės rūšies dezinfekcijos pretenzijos (balinimo alt.) Šaltojo ir gripo virusas (įskaitant H1N2) Salmonella & Staphylococcus	500 ppm	3,4gr - 1 tabletė - 2 litrai 5gr - 1 tabletė - 3 litrai 17,4 g - 1 tabletė - 10 litrai
Kraujo patogenas, herpesas ir poliomielito virusas, MRSA ir E Coli ŽIV ir Hep B, Covid - 19 teigia, kad daugelis gyvūnų patogenų	1.000 ppm	3,4gr - 1 tabletė - 1 litras 5gr - 1 tabletė - 1,5 litro 17,4 g - 1 tabletė - 5 litrai
C. Diff sporas 4 minutes (Specialistas slaugytojas Ülker Uysal Dokuz Eylül universiteto taikymas ir Tyrimų ligoninė, İzmir)	5.000 ppm	3,4gr - 5 tabletės - 1 litras 5gr - 5 tabletės - 1,5 litro 17,4gr - 5 tabletės - 5 litrai

INFECTINIS KONTROLĖS ATETIS YRA ČIA, IR TUALI IR SAUGI .

„Klortab NaDCC“ sukurtas kaip patogiausias ir ekonomiškiausias būdas išsiųsti, laikyti ir tepkite mažiau toksišką, stipresnį dezinfekavimo tirpalą. Apsaugokite aplinką ir žmones nuo žalingo poveikio ligų sukėlėjai niekada nebuvo tokie lengvi ar prieinamesni.

Koncentruotas Klortab NaDCC tabletės sveria 95% mažiau už atvejų nei skysto koncentrato Sanitizer / dezinfekcijos priemonė. Padarant ergonomišką kėlimą ir naudojant mažiau plastikų ir kartono, susidaro mažiau kietų atliekų.	„Klortab NaDCC“ taupo pinigus už siuntimą, saugojimo vietą ir bendras cheminių medžiagų išlaidas. ----- Klortab NaDCC yra mažiau toksiškas ir mažiau esdinantis žmones, medžiagas ir aplinką	„Klortab NaDCC“ sveria 7 kartus mažiau nei tradiciniai skysto koncentrato dezinfekavimo / dezinfekavimo priemonės, todėl siuntimo išlaidas mokate 7 kartus mažiau. „Klortab NaDCC“ užima mažiau kvadratinį metrą ir sutaupo pinigų saugojimui
---	--	---

Unikalūs Klortab NaDCC / hipoklorinės rūgšties (HOCL) ir chloro pranašumai baliklis / hipochloritas (-OCL)

Hipochlorido rūgštį natūraliai gamina mūsų kūnai baltieji kraujo kūneliai ir ašaros	„Klortab NaDCC“ yra plataus spektro dezinfekantas, turintis daugiau nužudymo teiginių nei kitos dezinfekavimo alternatyvos ekonomiškiau	pH neutraliu lygiu užtikrina, kad veiksmingesnis baktericidas HOCL išlieka dominuojantis tirpale
CDC ir EPA patvirtina, kad HOCL sunaikina patogenus iki 50 kartų geriau nei chloro baliklis	Klortab NaDCC neutralus pH yra paviršius, žmogui ir aplinkai nekenksmingas	Praskiestas Klortab NaDCC yra stabilus uždari konteineriai 7–30 dienų, priklausomai nuo nemokamo prieinamumo ppm Chloras (FAC); o chloro baliklis praskiedus, trunka tik kelias valandas
Klortab NaDCC naikina pelėsį ir miltigę, pašalina ir kontroliuoja kvapus	Testavimas ant metalinių paviršių įrodyti Klortab NaDCC yra 50% mažiau ėsdinanti tada balinimo, plius nepakenks audinius ar substratus normalaus naudojimo	„Klortab NaDCC“ yra universalus - nuo skalavimo be kontakto su maistu dezinfekavimo priemonės iki liginės dezinfekavimo priemonės, turinčios 4 minučių „Clostridium Difficile“ žudymo greitį
Nedisocijuota HOCL turi 4 kartus anti-mikrobų žudymo galios -OCLs		Klortab NaDCC yra ekonomiškai veiksminga ir tvari, kainuojančių mažiau laivų ir saugoti.

BEAT BAKTERIJOS SU GALINGA DEZINFEKUOJANČIOS / DEZINFECINIŲ KOMPAKTIŠKAS TABLETĘ.



Klortab NaDCC turi galią per 4 minutes sunaikinti 99,999% bakterijų ir išnaikinti C Diff sporas!

„Klortab NaDCC“ proaktyvios putojančios dezinfekcinės tabletės yra veiksmingos daugeliui mikroorganizmų ant iš anksto išvalytų, be porų, negyvų paviršių. Mikrobiologinė analizė baigtas Stambulas Yeditepe universiteto ir Klortab NaDCC tablečių buvo nustatyta, kad veiksmingas prieš Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, mikobakterijų TERRAE, Trycophyton mentagrophytes, Candida albicans, Aspergillus niger, Poliovirusų 1 tipo, 5 tipo žmogaus adenovirusas ir pelės Norovirus S99 Berlyno virusas.

Be šių, taip pat yra biocidinio aktyvumo testų, kuriuos atlieka tarptautiniai asmenys ir institucijos.

Naudojant sritis:

♦ Dienos darželiai, darželiai, mokyklos, universitetai ♦ Ligoninės, slaugos namai, medicinos ir stomatologijos Įranga ♦ Sporto salės, Sveikatingumo klubai, Sporto centrai, SPA ir salonai ♦ Restoranai, Maistas ir maitinimas Paslaugos ir virtuvės ♦ Greitoji pagalba ♦ Biurai, Prekybos centrai ir bakalėjos parduotuvės ♦ Teatrai, Sporto centrai, pramogų parkai ♦ viešbučiai, kurortai ir kruiziniai laivai ♦ gyvenamieji namai, Butai ♦ Veislynai, arklidės ir veterinarijos klinikos ♦ Žemės ūkis ir ūkininkavimas ♦ Gėrimai ir Maisto perdirbimo įmonės ♦ Transporto priemonės, traukiniai, autobusai ir avialinijos ♦ Jūrų, žvejybos laivai, Keltai, asmeninės valtys

MAŽA TABLETĖ, KURIUOJAMA JĖGA UŽKREIPTIS UŽ INFECINES LIGAS

Yra daug išskirtinių „Klortab NaDCC“ ir įprastų dezinfekavimo ar dezinfekavimo priemonių skirtumų, tokie kaip chloro baliklis, kvatos ir kitos stiprios cheminės medžiagos, iš kurių ne mažiau svarbus yra jo veiksmingumas ir ekonomiškumas. Ši unikali chemija yra mažiau toksiška ir pakankamai saugi naudoti kasdien, tačiau pakankamai galinga užmušti pavojingus mikrobus. Tai yra įrodyta, kad dezinfekuoti 99,999% iš įvairiausių bakterijų ir virusų, įskaitant "Super klaidų", kaip COVID-19, MRSA ir H1N1, nesukeliant kitų mutacija "Super klaidų."

Taupo gyvybes ir biudžetus	Universalesnis	Saugiau ir tvariau
Priklausomai nuo koncentracijos, HOCL sunaikina 99,999% bakterijų ir sunaikina C Diff per 4 minutes!	Avarinis patogenas krizė gali būti sprendžiami iš karto net greitosios pagalbos	Lentyna stabilus 2 metus Patogi ir saugiau žmonėms ir medžiagų
Sušvelnina infekcinių ligų plitimą, o ligos sustabdomos dar neprasidėjus	Saugiai dezinfekuoja paviršius, besiliečiančius su maistu, neskaldant	Mažiau pavojinga aplinkai ir mažiau ėsdinanti
Mažiau serga dienų konvertuoja didesnį našumą ir mažesnes finansinių nuostolių	Taip pat gali tapti sunkių dezinfekavimo	Lengvai transportuojamas ir sandėliuojamas už dalį alternatyvų kainos
Revoliucinis stabilizuotas NaDCC tabletė, kuri hipochlorito rūgšties (HOCL), kai vandenyje ištirpinto.		

ADA AQUA KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Çamlıca Mahallesi 147. Cadde Dimas İşyerleri Sitesi No:4-C Yenimahalle Ankara

PHONE: 0312 387 00 47 FAX: 0312 387 00 43 GSM: 0554 870 50 01

E.MAIL: info@adaaqua.com.tr www.adaaqua.com.tr



Didžiosios atsiliepiamai, kurios susijusios su cheminių, fizinių ir mikrobiologinių savybių chloro atpalaiduojančio agentų (KRA) yra prieinami. Natrio hipochloritas, chloro dioksidas ir Nchloro junginiai, tokie kaip natrio dichlorizocianuratas (NaDCC) su chloraminu-T, yra svarbiausios chlorą išskiriančių medžiagų rūšys. Natrio hipochlorito tirpalai plačiai naudojami paviršiaus dezinfekcijai (buitiniams balikliams), taip pat gali būti naudojami kraujo išsiliejimams, kuriuose yra žmogaus imunodeficitu viruso, dezinfekuoti. **(Tyrimą, kurio biologinės mechanizmo SARS-CoV-2, jos poveikis ir praeivios žmogaus organizmui ir Vaistai kad būtų sumažinta jų poveikį Rafa AY, Luisetto M, Musa N, Arif OB, Ilman A, T Haque)**

Nors ACC 200 ppm ar didesnė NaDCC parodė, kad vertinant tyrimą viruso titras sumažėjo daugiau nei 99,99% reakcijos metu nuo 20 s iki 5 minučių, viruso ir mėginio tūrio santykis 1: 9 esant NIID, NaDCC AC 100 ppm parodė, kad viruso titras sumažėjo daugiau nei 99,9% 40–5 minučių reakcijos metu. • Turimos chloro 50 ppm arba didesnis NaDCC parodė daugiau nei 99,99% sumažinti virusinės titras reakcijos laikas nuo 20 s, 1 min ir 5 min vertinimo tyrimu su 01:19 tūrio santykis viruso į mėginio OUAVM. Atkreipkite dėmesį: Komitetas elgiamasi NaDCC kaip medžiaga suskirstyti į haw (nonelectrolytically sukurtas), tačiau į NaDCC sprendimo rezultatai buvo aprašyti atskirai nuo Haw dėl šios priežasties. O vandeninis tirpalas NaDCC yra tam tikrą kiekį hypochloric rūgšties, be chloro atleidžiamas nuo dichloroizocianuratas pagal disociacijos pusiausvyros reakcijos. Taigi vandeninis NaDCC tirpalas turi skirtingas savybes įprastas HAW. **(Galutinė ataskaita apie veiksmingumo vertinimo dezinfekuoti Medžiagos Alternatyva alkoholio naudojimas prieš sunkus ūmus respiracinis sindromas corona 2 (SŪRS-CoV-2) - Nacionalinė technologijos institutas ir vertinimą (NITE) - Japonija)**

NaDCC skiriasi nuo baliklio ir turi žemesnį pH, o tai reiškia, kad jo antimikrobinės galimybės skiriasi. Yra naudos NaDCC, kad ji turi rezervą dezinfekuojančių galimybes, bet jis tiesiog nenaudojamas kaip pagrindinis siurblys JAV teritorijoje, nes ji reikalauja didesnių koncentracijų. Galų gale, JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) rekomenduoja baliklius, tokius kaip „Clorox“. Taigi, nors JK ligoninės prieš daugelį metų nustojo naudoti baliklius, svarbu pažymėti, kad šis tyrimas nebuvo atliktas su tais pačiais dezinfekavimo priemonėmis, kuriuos naudojame JAV, ir palyginti obuolius su obuoliais būtų klaidinanti. Nors šis tyrimas atskleidžia, kaip lengvai chalatai gali būti užteršti C. diff sporomis, reikėtų atsižvelgti į dezinfekavimo priemonių rūšis. **(Atskyrus atsparius gandus ir C. diff dezinfekantus - 2019 m. Rugpjūčio 29 d. | Saskia v. Popescu, daktaras, MPH, MA, CIC, vyresniosios ligoninės infekcija Prevencijos epidemiologas, „HonorHealth“)**

Baliklis (natrio hipochloritas) yra nebenaudojamas bet britų ligoninėje paviršiaus valymo ir dezinfekavimo, tačiau priešingai populiarųjį mitas, balinimo niekada nebuvo "uždrausta" Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS). Vertinant dezinfekavimo naudojami JK ligoninėse, NHS priėmė sprendimą, kad pakaitinis balinimo remiantis natrio dichloroizocianuratas (NaDCC) buvo lygiai taip pat veiksmingos, kaip dezinfekavimo, įskaitant, kai naudojamas kaip sporicidinis bet neturėjau tokio paties lygio pavojaus sveikatai arba sukelti tiek pat žalos ligoninės įrangai ir aplinkai kaip baliklis Ar naudojama praskiedimo produkto pristato tarp 6 ir 7 pateikiant neutralų spektrą ir mažinti abu galimą žalos įrangai ir aplinką pHsu visais šių išmokų, NaDCC vis dar kelia labai plataus spektro veiksmingumą EPA registruotas pretenzijų spręsti Clostridium difficile sporas, norovirus, ŽIV, HBV, gramneigiamų bakterijų, gramteigiamų bakterijų, iš virusus be apvalkalo, skaičių ir Mycelium tuberkuliozės JAV. Be to, EPA registruotas NaDCC už sporicidinis naudojimui 4300 ppm, palyginti su dauguma balinimo registracijų, kurie yra tarp 8500 ir 10000 ppm, kai naudojamas kaip sporicidinis - mažiau chemijos rezultaty mažiau žalos ir mažiau pavojaus sveikatai. **(Kodėl britų ir airių Ligoninės delpingo kaina Baliklis - NAUJIENOS pateikė - Medentech, Ltd - Lap 17, 2015 08:45 ET)**

Mėginiai buvo renkami 5 dienas per 2 savaites laikotarpį. Vieno paciento kambario mėginiai buvo imami prieš įprastą valymą, o 2 pacientų kambariai - po jo įprastos valymas. Dukart per dieną valomos labai liečiamos vietos, naudojant 5000 ppm natrio dichloroizocianurato. Grindys buvo valomos kasdien naudojant 1000 ppm natrio dichloroizocianurato. **(Oro, paviršiaus ir asmeninės apsaugos priemonių užteršimas sunkiu ūminiu kvėpavimo takų sindromu Koronavirusas 2 (SARS-CoV-2) iš simptominio paciento - 2020 m. Amerikos medicinos asociacija)**