

Süt Mutfakları

Bebek besleme biberonlarının geniş ölçekli dezenfeksiyonu diğer metotlardan ziyade Klortab NaDCC solüsyonları kullanılarak çok daha uygun bir şekilde elde edilebilir. Bu metot, sıcağa dayanıksız plastik biberonların daha uzun süre kullanılmalarını sağlamaktadır. Solüsyonun pH'ı süt taşı formasyonlarını engeller, dolayısıyla plastik biberonların ömürleri daha uzun olur ve uzun süre şeffaf olarak kalır.

Dezenfeksiyon için	1 adet Klortab NaDCC 3,4gr için gerekli su hacmi	Talimatlar ve Notlar	ppm (mg/lt) konsantrasyonu
Bebek biberonları, emzikler ve süt pompaları dezenfeksiyonu	8 litre	30 dakika veya daha uzun sürede içlerinde hava kabarcığı almadan solüsyona batırılır.	125

Doğum Sonrası Kullanımı:

8 litre musluk suyunda eritilen 1 adet Klortab NaDCC tableti ile şişmeden dolayı meydana gelen ağrının azaltılması ve enfeksiyon indirgenmesi için mahrem bölgelerin dış kısmına kompres gibi kullanılabilir.

Klortab NaDCC 3,4gr tabletleri evler ve hastanelerde bebek biberonlarının dezenfekte edilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu durum biberonların, emziklerin vs. dezenfeksiyonu için annelere mutlaka tavsiye edilmelidir. (Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Bakım Departmanı – Ağustos 1993 kurallarına göre)

Uzun yıllardan beri Bebek Biberonları Dezenfeksiyon Tabletleri Avrupa, İsrail ve dünyanın diğer bir çok ülkesinde geniş bir şekilde kullanılmaktadır. NaDCC tabletleri AFNOR standartlarına çok sıkı bir şekilde bağlı kalarak değerlendirilmektedir.

Bu standartlar Avrupa Birliği ülkelerinde (ve dünya çapında) kabul edilmiş standartlardır. Klortab NaDCC tabletleri patojenik test bakterileri (E. Coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium ve Mycobacterium smegmatis) ve bebek ağızlarında pamukçuk enfeksiyonuna sebep olan fungi candida albicanslara karşı etkililik için T.C. Yeditepe Üniversitesi, Biyosidal ve AR&GE Laboratuvarları tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Kelime anlamı olarak AFNOR testleri test konsantrasyonunda 5 dakikalık bir süre içinde süspansiyondaki mikro organizmaların ve cama yapışmış olanların ise 30 dakika içinde (bunlar plastik şişe ve silikon veya plastik memelere yapışanlarla aynıdır) % 99.999 oranında ölmesini talep etmektedir. Candida'ya karşı yapılan testler ise % 1 süt içerisindeki mikropların 40 dakikadan daha az bir sürede ölmesini gerekli tutan Birleşik Amerika FDA standartlarına göre yapılmıştır. (NaDCC tabletleri ile 2 litrelik dezenfeksiyon kabı içindeki 10mL süt içinde test koşullarında 10 dakikadan kısa bir süre içinde bütün mikroplar ölmektedir.)

Klortab NaDCC tabletleri oda sıcaklığında cam, plastik ve lastik malzemeleri mükemmel bir şekilde dezenfekte etmektedir. Tabletler biberonlar tam anlamıyla temiz olmasalar bile, % 2 v/v süt kalıntısında aktiftir. Aynı solüsyon 24 saat süreyle kullanılarak bir çok biberon ve emziğin dezenfeksiyonu sağlanabilir, bu da hastanelere ve ailelere ekonomik olarak katkıda bulunur. Biberonlar ve emzikler kullanılabildiği kadar solüsyon içinde bırakılır ve kullanımdan önce görsel olarak hiçbir kirlilik kalmayana kadar eller sabunla yıkanmalıdır. Genel olarak bebek biberonları ve emziklerinin sterilizasyonuna 6 aylık olana kadar devam edilmesi kabul edilmektedir.