



Klortab NaDCC

5 gram x 100 Tablet

Cilt ve Yaralar için

Kullanıcı ambalaj içeriği

Kullanıma karar vermeden önce aşağıdaki bilgiler dikkatlice okunmalıdır.

KLORTAB NaDCC – Efervesan Dezenfeksiyon Tabletleri

Aktif madde: Sodyum Troklozen

Tedavi edici aktivite: Cilt ve açık yaralar için antiseptik

Bu ürün ne zaman kullanılmamalı:

Kullanıcının aktif maddeye hassasiyeti olduğunun bilindiğinde

Uyarılar:

Eğer hastanın herhangi bir ilaca veya temizleme maddelerine alerjisi varsa, hekim uygulamaya başlanılmadan önce uyarılmalıdır.

Özel önemiyet verilmesi gereken hususlar:

Nadir durumlarda hazırlanmış solüsyon tahrişe bağlı döküntüye sebep olabileceği için tedavi durdurulmalı ve hekim bilgilendirilmelidir.

Dozaj ve talimatlar:

Bir adet efervesan tablet aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir miktar içme suyu içerisinde gizli elde edilebilir klor ihtiva eden solüsyon elde etmek için eritilir. (pH: 5,5 – 6,5).

Endikasyon	Su miktarı – 5gramlık 1 tablet için	Talimatlar ve notlar	ppm
Tedavi edici kullanım: Açık yaralar, basınç yaraları, cilt greftleri, doğum sonrası harici parçalar	1 litre	Islak silme	1.500
Fizyoterapi ve hidroterapi havuzları – yanık hastalar dahil	150 litre	Banyo	10
Tedavi öncesinde banyoların hazırlanması	2 litre	Yüzeylerin silinmesi	750
Ayak bakımı cerrahisi öncesi el veya ayak	5 litre	5 dakika solüsyona daldırma	300
Atlet ayağı veya diğer cilt mantarlarının adjuvan tedavisi	600ml	Mümkün olduğunca kompres uygulama	2.500
Ameliyat öncesi cilt hazırlama	600ml	Cilt silinmesi	2.500
Diş kanal kökü tedavisi	1 litre	Ödem oluşumunu ve ağrıyı azaltır	1.500
Kirlenmiş doku tedavisi	300ml	Islak bir kumaş parçası ile uzun süreli	5.000

**Uyarı:**

Tabletler yutulmamalıdır. Bunlar sadece Harici Kullanım için su içinde eritilerek bir antiseptik solüsyon elde etmek için tasarlanmıştır.

Solüsyondan maksimum fayda sağlamak için hazırlanacak su miktarı dikkatlice ölçülmelidir.

Başarılı bir tedavi için ne yapılmalı?

Artık solüsyon devam eden tedaviler için kullanılmamalıdır.

Eğer atlet ayağı veya diğer mantar enfeksiyonlarında kullanmak üzere adjuvan olarak KLORTAB NaDCC aldıysanız, temas süresinin mümkün olduğu kadar uygulanabilir olması önemlidir. "Islak kumaş periyodu" sonunda bölge dikkatli bir şekilde kurulanmalıdır. KLORTAB solüsyonun periyot boyunca ıslak kumaş olarak uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde Sadece diğer ilaçlar (damla, merhem, ilaçlı pudra) kullanılmalıdır. Eğer ayaklarda mantar varsa, dikkatli bir şekilde yıkanması ve parmak aralarının kurulanması önemlidir. Diğer önemli bir nokta yün veya sentetik kumaşlar yerine pamuklu çorap kullanılmalı ve gün içerisinde terlemeye bağlı olarak birkaç defa değiştirilmelidir. Uygun hava koşullarında çorapsız sandal giyilmesi de tercih edilebilir.

Zehirlenmeden korunma:

Bu ve bunun gibi bütün ilaçlar olası kazaları engellemek için çocukların ve bebeklerin erişemeyecekleri kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Tabletin yutulması veya hazırlanmış solüsyonun içilmesi durumunda NÖTRALİZE ETMEK İÇİN SÜT İÇİLMELİDİR.

Hastane acil servisine başvurulmalı ve bu etiket örneği gösterilmelidir. Doktor tarafından tavsiye edilmedikçe hasta kusturulmamalıdır.

Depolama: Kullanımdan sonra hava ve rutubetten etkilenmemesi için kapak tekrar kapatılmalıdır. Kuru ve karanlık yerlerde depolanmalı, tabletlerin asitlerle temasından kaçınılmalıdır. Hazırlanmış KLORTAB solüsyonun kullanılmayan kısmı düzgün bir şekilde etiketlenmiş kapalı ambalajda 10 güne kadar saklanabilir.

Bununla birlikte solüsyonun tekrar kullanılmasından ziyade her seferinde yeni solüsyon hazırlanması tercih sebebidir.

Hatta verilen tavsiyelere göre düzgün bir şekilde saklanan ilaçların bile sınırlı bir ömrü olduğu unutulmamalıdır. Ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat edilmesi gerekir. Şüphe durumunda mesul müdüre danışılmalıdır. Diğer ürünler KLORTAB kutularında saklanmamalıdır.